



Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

## Gebrauchsinformation

# Heparin AL Gel 30.000

**Wirkstoff: Heparin-Natrium 30.000 I.E. pro 100 g Gel**

### **Zusammensetzung**

100 g Gel enthalten:

Arzneilich wirksamer Bestandteil:

0,2 g Heparin-Natrium (Mucosa vom Schwein), entspr. 30.000 I.E.

Sonstige Bestandteile:

Poly(oxyethylen)-6-glycerolmono/dialkanoat (C<sub>8</sub>-C<sub>10</sub>), Levomenthol, Natriumedetat, Polyacrylsäure, Polysorbat 80, Propan-2-ol, Sorbitol, 2,2',2''-Nitrilotriethanol, Latschenkiefernöl, Kiefernadelöl, gereinigtes Wasser

### **Darreichungsform und Inhalt**

Originalpackung mit 40 g Gel (N1)

Originalpackung mit 100 g Gel (N2)

### **Stoff- oder Indikationsgruppe**

Zur Verminderung von Schwellungen

**ALIUD® PHARMA GmbH & Co. KG**

Gottlieb-Daimler-Straße 19 · D-89150 Laichingen

Internet: [www.aliud.de](http://www.aliud.de) · E-Mail: [info@aliud.de](mailto:info@aliud.de)

### **Anwendungsgebiete**

Zur unterstützenden Behandlung bei akuten Schwellungszuständen nach stumpfen Verletzungen (Prellungen/Blutergüsse).

### **Gegenanzeigen**

**Wann dürfen Sie Heparin AL Gel 30.000 nicht anwenden?**

Dieses Arzneimittel darf nicht angewendet werden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Heparin-Natrium oder einen der sonstigen Bestandteile der Gelgrundlage.

**Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?**

Bisherige Erfahrungen mit der Anwendung bei Schwangeren und Stillenden haben keine Anhaltspunkte für schädigende Wirkungen ergeben. Heparin ist nicht plazentagängig und tritt nicht in die Muttermilch über.

### **Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise**

**Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden?**

Heparin AL Gel 30.000 soll nicht auf offene Wunden und/oder nässende Ekzeme aufgebracht werden.

### **Wechselwirkungen mit anderen Mitteln**

#### **Welche anderen Arzneimittel beeinflussen die Wirkung von Heparin AL Gel 30.000?**

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind bei örtlicher Anwendung nicht bekannt.

### **Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung**

*Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Heparin AL Gel 30.000 nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Heparin AL Gel 30.000 sonst nicht richtig wirken kann!*

#### **Wie viel von Heparin AL Gel 30.000 und wie oft sollten Sie Heparin AL Gel 30.000 anwenden?**

Heparin AL Gel 30.000 soll 2- bis 3-mal täglich dünn und gleichmäßig auf das Erkrankungsgebiet aufgetragen werden.

#### **Wie lange sollten Sie Heparin AL Gel 30.000 anwenden?**

Über die Dauer der Anwendung entscheidet der Arzt. Wenn nicht anders verordnet, sollten Sie Heparin AL Gel 30.000 ca. 1 bis 2 Wochen anwenden.

### **Nebenwirkungen**

#### **Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Heparin AL Gel 30.000 auftreten?**

Allergische Reaktionen auf Heparin bei Anwendung auf der Haut sind sehr selten. Jedoch können in Einzelfällen allergische Reaktionen wie Rötung der Haut und Juckreiz auftreten, die nach Absetzen des Präparates in der Regel rasch verschwinden.

*Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.*

#### **Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen?**

Heparin AL Gel 30.000 sollte bei Auftreten von allergischen Hautreaktionen abgesetzt werden. Bitte informieren Sie hiervon Ihren Arzt. Darüber hinaus sind keine weiteren besonderen Maßnahmen notwendig.

### **Hinweise zur Haltbarkeit des Arzneimittels**

Das Verfallsdatum dieses Arzneimittels ist auf der Faltschachtel und der Tube aufgedruckt.

Verwenden Sie dieses Arzneimittel nicht mehr nach diesem Datum!

### **Stand der Information**

Juni 1997

**Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!**

